


स्वाइन-फ्लूच्या साथीचा सामना करूया !



स्वाइन-फ्लूची शंका केव्हा घ्यावी ?

- घसा-दुखी, खोकला असेल व त्यासोबत 100° फॅ.पेक्षा जास्त ताप सतत दोन दिवस असेल तर

किंवा

- तापासोबत केव्हाही दम लागला तर ते गंभीर लक्षण समजून ताबडतोब उपचारासाठी जावे.

किंवा

- घसा-दुखी, ताप याबरोबरच ज्यांच्या बाबतीत खालील गोष्टी असतील अशांबाबतही स्वाइन-फ्लू ची शंका घ्यावी-


१. गेल्या आठ दिवसात परदेश प्रवास झाला असेल तर

२. गेल्या आठ दिवसात स्वाइन-फ्लूच्या रुग्णाशी निकटचा संपर्क झाला असेल तर



शंका आल्यावर काय करावे ?

- आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे किंवा जवळच्या निर्देशित सरकारी केंद्रामध्ये प्राथमिक छाननीसाठी जावे.



- जाताना नाकातोंडाला चौपदरी फडके किंवा मास्क लावावा.



डॉक्टर छाननी करतील व 'संशयित रुग्ण' आहे असे वाटल्यास रुग्णाच्या घशातील थेंबाचे सॅपल घेऊन ते स्वाइन फ्लूच्या निदानासाठी पाठवतील. तपासणीच्या रिपोर्टची वाट न पाहता अशा संशयित रुग्णावर 'टॅमीफ्लू' या गोळ्यांचा उपचार सुरू करायचे आता ठरले आहे.

आपल्याला लागण होऊ नये यासाठी काय काळजी घ्यावी?

- संशयित रुग्ण किंवा स्वाइन फ्लू झालेला रुग्ण याच्या जवळ (सहा फुटाच्या आत) जाऊ नये.
- थिएटर, नाट्यगृह, एअर कंडिशनड मॉल्स इ. बंदिस्त व गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये.
- बाहेरून जाऊन आल्यावर साबणाने हात धुवावे कारण स्वाइन फ्लूचे विषाणू लागण झालेल्याच्या खोकल्यातून, शिंकांमधून बाहेर पडून टेबल, खुर्ची, बस अशा आसपासच्या ठिकाणी स्थिरावून ३ ते ८ तास जिवंत राहतात. याच कारणासाठी नाक, चेहरा याला हात लावायचे टाळावे.
- एकमेकांना भेटतांना हस्तांदोलन करू नये.






मास्क कोणी लावावा ?

- सगळ्यांनीच मास्क लावण्यात अर्थ नाही. स्वाइन फ्लूचे रुग्ण, संशयित रुग्ण, खोकला-तापाचे रुग्ण यांनी मास्क (किंवा चौपदरी फडके) लावायला हवे. खोकतांना शिंकताना त्यांच्या नाकातोंडातून उडणारे विषाणुयुक्त शिंतोडे त्यामुळे अडतील.
- या रुग्णांवर किंवा संशयित रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर्स, इतर कर्मचारी यांनी तसेच रुग्णाची, संशयित रुग्णाची काळजी घेणारे कुटुंबिय यांनी एन-९५ हा अधिक चांगला मास्क लावणे आवश्यक आहे.
- मास्क, फडके धुवून परत वापरायला हरकत नाही.


विशेष काळजी कोणी घ्यावी?

- गरोदर स्त्रिया,
- वृद्ध माणसे
- पाच पेक्षा कमी वयाची मुले
- एच.आय.व्ही. लागण झालेल्या व्यक्ती
- मधुमेह, दमा, हृदयविकार इ. असणा-या व्यक्ती



रुग्णांनी काय करावे ?

- संशयित रुग्णांनीही घराबाहेर पडू नये. साधा मास्क लावावा.
- शासकीय यंत्रणेतून मिळणा-या गोळ्यांचा कोर्स पूर्ण करावा.
- शिंकतांना, खोकतांना चौपदरी रूमाल नाका-तोंडापुढे धरावा.
- घरातील फरशी, टेबल इ. फिनेलच्या पाण्याने रोज पुसायला हवे.
- भरपूर पाणी प्यावे, नीट आहार घ्यावा.
- सर्व लक्षणे गेल्यावर पुढे एक दिवस घरी थांबून मगच घराबाहेर पडावे. त्या आधी घराबाहेर पडावे लागले तर मास्क घालावा.



नागरिकांनी काय सहकार्य करायला हवे ?

- घाबरू नये. स्वाइन फ्लूचे बहुसंख्य रुग्ण आपोआप बरे होतात. फक्त थोड्याच रुग्णांना गंभीर स्वाइन-फ्लू होतो. वेळेवर उपचार मिळाल्यावर तेही बरे होतात.
- सुट्टी मिळालेल्या मुलांना घराबाहेर जाऊ देऊ नये. कारण त्यापैकी कोणाला लागण झाली तर स्वाइन फ्लूची लक्षणे दिसण्याआधीच एक दिवस त्याच्या श्वासातून, शिंका-खोकल्यातून हे विषाणू पसरू लागतात.
- धार्मिक सण फक्त घरातच साजरे करावे. इतर सार्वजनिक कार्यक्रम व उत्सव सध्या बंद ठेवावे. देऊळ, चर्च, मशीद इ. ठिकाणी जाऊ नये.
- माझे सॅपल घेतलेच पाहिजे, मला 'टॅमीफ्लू' मिळालेच पाहिजे असा विनाकारण अट्टाहास धरू नये.



वेळेवर औषधोपचार मिळाल्यावर
स्वाइन फ्लू बरा होण्याचे प्रमाण
खूप जास्त आहे. तरी विनाकारण
घाबरू नये.